


# LUXAN Boomcleaner



## Tegen insecten en mijten in fruit- en sierbomen



**Voldoende voor:** 16 liter spuitvloeistof

**Dosering:**

**Perzik:** 53 ml per liter water

**Appel tegen schildluis:** 81 ml per liter water

**Overige toepassingen:** 64 ml per liter water

**Werkzame stoffen:** Zepen

### ALGEMEEN

**Luxan Boomcleaner** is samengesteld uit zepen die een prima werking hebben op de diverse overwinteringstadia van tal van insecten en mijten. Het middel wordt in de winter en tijdens het vroege voorjaar toegepast, bij vorstvrij en sneldrogend weer, als alle knoppen nog in rust zijn. Het beste resultaat wordt verkregen door het middel toe te passen als de temperaturen overdag tot boven de 10°C stijgen. De behandelde bomen en struiken zullen het nieuwe seizoen verlost van plaaginsecten kunnen ingaan. Door de specifieke werking van het middel is resistentie niet mogelijk. Luxan Boomcleaner bestrijdt de eerste golf aan schadelijke insecten voordat nuttige insecten zich ten volle ontwikkelen. Bovendien bevinden de nuttige insecten zich op het moment van behandeling op plaatsen waar Luxan Boomcleaner geen effect heeft. Dit middel heeft als gunstige nevenwerking dat het bomen reinigt van aanslag.

### GEBRUIKSAANWIJZIGING

Luxan Boomcleaner dient verdund met water te worden verspoten. Zorg ervoor dat de stam en de takken goed 'ingewassen' worden met de spuitoplossing. Bespuit daarom krachtig tot het afdruiptadium waarbij vooral aandacht dient te worden geschonken aan die delen waar insecten zich schuil kunnen houden. Spuit op een zodanig tijdstip van de dag dat het gewas voor de avond droog is. Voor een optimaal eindresultaat dient de dagtemperatuur minimaal 10°C te zijn.

### ATTENTIE

Bij appel en peer kan Luxan Boomcleaner worden ingezet tot en met het ontvouwen van het eerste klusterblad. In perzik niet spuiten na half januari. In overige gewassen kan worden gespoten tot het schuiven van de eerste knoppen.

FRUITGEWASSEN; APPEL, PEER, KERS, PERZIK, PRUIM ter bestrijding van eieren en andere overwinterende stadia van o.a. appelbladvlo, perenbladvlo, bladluizen, bloedluizen, schild- en dopluizen en de kleine wintervlinder.

**Dosering in perzik:** 53 ml per liter water (niet toepassen na eind januari i.v.m. schadekansen)

**Dosering in appel tegen schildluis:** 81 ml per liter water

**Dosering overige toepassingen:** 64 ml per liter water

BESSEN; RODE-, WITTE- EN ZWARTE BESSEN, KRUISBESSEN, BRAMEN EN FRAMBOZEN IN DE VOLLEGROND ter

bestrijding van eieren en andere overwinterende stadia van o.a. bladluizen, schild- en dopluizen, bontebessenvlinder, bessenspruitvreter, frambozencicade, frambozengalmijt, frambozenspruitvreter en kruisbessenspintmijt.

**Dosering:** 64 ml per liter water

BOOMKWEKERIJGEWASSEN; BLADVERLIEZENDE HEESTERS ter bestrijding van eieren en andere overwinterde stadia van o.a. bladluizen, dop-, schild- en wolluizen, sparrenuizen, galmijten, bladvlooiën, kleine wintervlinder, bontebessenvlinder en jeneverbesmot.

**Dosering:** 64 ml per liter water

Opmerkingen:

- Niet toepassen op *Chamaecyparis obtusa* en haar cultivars en niet op *Juniperus Virginiana* "Canartii", "Glaucá" en "Schottii" en gele cultivars en andere coniferen.
- **Niet spuiten op vaste planten of andere kruidachtige gewassen.**
- Vroegwerkende gewassen zoals *Buxus*, *Ilex*, *Picea* en *Taxus* in december/begin januari behandelen. Bij laat werkende gewassen kan als regel tot maart/half april worden gespoten, zolang deze volledig in rust zijn.
- De toepassing op bladdragende heesters en coniferen is volledig voor eigen risico.

#### WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Volgens de Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen (RUB) uitsluitend te gebruiken voor bestrijding van insecten en mijten op planten.

*Gebruik biociden en gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.*

---



DCM Nederland B.V. – Valkenburgseweg 62-a – 2223 KE Katwijk. [www.luxan.nl](http://www.luxan.nl)